


Goéland pontique *Larus cachimans* MR / HR
L 55-60 cm. E 138-147 cm. Très proche des G. brun et leucophée mais récemment reconnu comme espèce. Lacs, rivières, retenues en Europe orientale et Asie centrale ; s'est étendu vers l'O voici peu, devenant un visiteur bien plus régulier de la Baltique et des côtes du N-O de l'Europe, surtout en été-automne. Une hybridation limitée se produit là où le Pontique voisine avec les G. argenté et leucophée (Pologne) mais le succès reproducteur des couples mixtes est mal documenté. Niche en colonie, recherchant, à l'O de la mer Noire, les îlots bas et les rivages peu profonds, à l'écart, au contraire du Leucophée préférant falaises et toits (sauf en zone méditerranéenne où il choisit aussi les îlots de deltas, etc.).

CARACTÉRISTIQUES Quatre classes d'âge (v. p. 178). Presque aussi grand que les G. leucophée et argenté ; par rapport au second, un peu plus élancé, à tête plus petite, pattes et ailes plus longues, front plus plat et arrière de la calotte assez anguleux. Se tient souvent plus droit que les autres, avec le cou étiré ou la poitrine avancée, les ailes assez bas. Bec long et d'épaisseur constante, à bout régulier, sans angle gonyaque marqué. Hors nidification, bec de l'ad. assez vert-jaune pâle et pattes d'ordinaire rose chamois clair, plus pâles que chez le G. argenté. Tache rouge du bec restreinte à la mandibule inférieure (cf. Leucophée). Œil souvent sombre (chez environ 75% des ind., nettement plus sombre que chez l'Argenté et le Leucophée). Comparé aux G. leucophée et d'Arménie, ad. à manteau gris plus clair, plus comme l'Argenté de Fennoscandie. Bout de l'aile avec moins de noir, plus de miroirs blancs et des languettes blanches pénétrant davantage dans le noir. Ad. hivernal souvent repéré à sa tête en apparence blanche sans stries (de très discrètes rayures autour de l'œil et à la calotte se voient de tout près), à l'œil sombre et aux différences morphologiques évoquées ci-dessus. - *Juv.* : tête blanchâtre avec « chèle » sombre, brun-gris en bas de l'arrière du cou, bec tout noir, croupion blanchâtre et nette barre caudale noire. Dessous brun-gris pâle, et couv. sous-alaires en moyenne plus pâles que chez le Leucophée du même âge (mais certains s'en rapprochent). Primaires internes brun et nette barre caudale noire. Dessous brun-gris pâle, et couv. sous-alaires en moyenne plus pâles que chez le Leucophée du même âge (mais certains s'en rapprochent). Primaires internes brun et nette barre caudale noire. Dessous brun-gris pâle, et couv. sous-alaires en moyenne plus pâles que chez le Leucophée du même âge (mais certains s'en rapprochent). Primaires internes brun et nette barre caudale noire.


plus pâle chez la plupart. - *2^e hiver* : très proche du 1^{er} hiver mais bec davantage bicolore, les deux tiers proximaux étant brun-rose clair. Vers la fin de l'hiver, mue du corps et des couv. alaires, donnant le premier plum. d'allure ad. vers le 2^e été. Plumes grises du dessus alors sans marques sombres ou presque, et tertiaires en majorité gris clair à bout blanc, avec subsistance d'une proportion variable de taches sombres. - *3^e année* : pattern alaie comme l'ad. ; reconnu à la barre subterminale sombre au bec et aux marques sombres persistant aux couv. primaires, à la queue et aux tertiaires. **VOIX** Clameur de l'ad. émise les ailes levées (position dite d'albatros). Par rapport au Leucophée, voix plus aiguë, « enfantine », et débit plus pressé, la clameur étant parfois comparée à un staccato d'otarie ou d'âne.

Goéland ichthyaète *Larus ichtyaetus* MO
L 58-67 cm. E 146-162 cm. Bien que n'étant pas un laridé à tête blanche, est traité ici pour permettre la comparaison, en raison de sa taille et parce que les imm. ont une tête blanchâtre. Niche en colonies ; marais, îles des lacs, etc. Hiverne en petit nombre au Moyen-Orient ; occasionnel en Europe, au nord jusqu'en Suède. Alim. : poissons, insectes (« mouche-ronne » aussi), petits mammifères... **CARACTÉRISTIQUES** Quatre classes d'âge (v. p. 178), mais développement initial du plum. rapide comme chez une espèce à trois classes d'âge. À peu près de la taille du G. argenté mais à corps plus élancé et à plus longues ailes ; front nettement plat renforçant l'aspect du bec long et fort. En vol, ailes un peu plus étroites que chez les autres grands goélands ; poitrine puissante, longue tête et bec fort donnant une allure lourde de l'avant. La grande taille et la tête noire de l'ad. nuptial évitent toute confusion, mais un oiseau posé en autre plum. peut être pris pour un G. pontique, s'il n'y avait le « loup » sombre, les croissants oculaires blancs et le long bec. - *Ad.* : moitié externe de l'aile essentiellement blanche avec un croissant noir dessus, au bout. Bec jaunâtre (un peu rouge à la pointe en été) avec barre transversale noire. Pattes jaunâtres. - *Juv.* : motif écaillé brun dessus ; bande pectorale ou côtés de la poitrine bruns contrastant avec le reste du dessous blanc ; plage alaie centrale gris clair, frappante ; couv. sous-alaires blanches ; large et nette barre caudale noire ; bec pâle à pointe sombre ; pattes grisâtres ou chair brunâtre. - *1^{er} hiver* : comme le juv. mais dos gris clair comme l'ad., arrière du cou foncé et, en 1^{er} été, souvent une nuance jaunâtre au bec et aux pattes. - *2^e année* : comme l'ad. mais plus de noir à la main et étroite barre caudale noire. - *3^e année* : comme l'ad. mais un peu plus de noir au bout des ailes et, parfois, vestige de barre caudale.

VOIX Bruyant à la colonie. Cri de vol *aah* grave, assez nasillard, assez proche du G. brun.



GOÉLAND PONTIQUE



GOÉLAND ICHTHYAËTE

